

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百三十五

詳校官太醫院醫官<sub>注</sub>姜晟

編修臣倉聖脉覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脉

校對官中書臣王鍾泰

謄錄監生臣崔鶴立

欽定四庫全書

普濟方卷一百三十五 明

周王朱橚撰

傷寒門

陰陽毒

論

夫陰毒盛而陽暴絕則為陰毒若陽毒盛而陰暴絕則為陽毒大凡陰陽離絕非大汗不能復其正氣也六脈俱洪大或沈取之大而不甚疾者非陰症也陽毒其脈當弦而洪數陰毒其脈沈細而疾陽病則身熱而無汗

陰病則身冷而有汗岐伯云陽勝則身熱腠理閉喘促  
為之俯仰汗不出而熱陰勝則身寒汗出數慄而寒寒  
則厥此症不可以常法治之金匱論陽毒之為病面赤  
斑斑如錦文咽喉痛唾膿血五日可治七日不可治陰  
毒之為病面目青身疼狀如被打咽喉痛死生與陽毒  
同 三因云病者頭重頸直皮肉強痺或蘊而結核起  
於喉頸之側布熱毒於皮膚分肉之中上散於髮際下  
貫顙顙隱隱而熱不相斷離病名黃肉隨以四季各十

八戊巳日其病從太陽陽明相隅寒濕不調關節隅滯  
若腑虛則皮肉強痺若臟實則布毒熱於皮膚又云病  
者裏熱外寒意欲守火而反引飲腰痛欲折或胸脇切  
痛類如刀刺不得轉動熱彭彭服冷多則洞瀉病名黑  
骨溫以冬三月源從足太陽少陰相搏蘊積壅塞若腑  
虛為陰毒所傷則裏熱外寒若臟實為陽毒所損則彭  
彭發熱又云病者發熱腰痛強急脚縮不伸脰中欲折  
目中生花或漚漚增寒復熱頸中雙筋牽不得屈伸項

直背強眼赤黃欲轉動合身回側病名青筋牽者由春三月其源從厥陰涉足少陽少陽之氣始發少陰之氣始衰陰陽拂鬱於腠理腑臟受厲而生若腑虛則為陰邪所傷故發熱若臟實則為陽毒所傷故增寒又云病者脈促身顫掉不能禁或內熱口乾舌破咽塞聲嘶病名赤脈攢者以夏三月其病從少陰太陽之氣相搏而停則榮衛不通皮肉痛起太陽發動少陰淫邪之氣因而作厲則臟腑隨時受疫病也若腑虛則陰邪所傷則

寒戰若臍實為陽毒所侵則內熱矣

方

治青筋牽

三因方  
鮑氏方

肝腑臟溫病陰陽毒臍腑虛為邪陰

所傷腰脇強急脚縮不伸脰中欲折目中生花色蒼

蒼者

芫胡

去苗  
五兩

茯苓

梔子仁

半夏

湯洗

大青

各三兩

桂

心

竹茹

香豉

甘草

右咬咀每服五錢水二盞薑五斤煎七分去滓空心

溫服

又方

三因方  
鮑氏方

肝臟腑溫病陰陽毒肝臟實為陽毒所傷

漚漚惡寒翕翕發熱頸外雙筋牽不得屈伸項直背

強眼赤黃轉動則合身回側色蒼蒼者

玄參

一兩

細辛

二兩

梔子仁

黃芩

升麻

芒硝

各三

兩

石膏

煨八兩

右剉散每服五錢水二盞入車前草三葉淡竹葉七

片煎七分去滓空心服



治赤脈攢

三因方  
鮑氏方

心腑臟溫病陰陽毒若腑虛為陰邪

所勝脈促身顫掉不能禁色昏赤者

茯苓 人參

桔梗

各三分

甘草

一兩半

白芷

青皮

各一兩 乾薑

炮半

右剉散每服五錢以水二盞煎七分去滓食前服

又方

三因方  
鮑氏方

心腑臟溫病陰陽毒心腑實則為陽毒所

傷內熱口乾舌破咽塞聲嘶色焦赤者

天門冬

去心

麥門冬

去心

車前子

炒

梔子仁

黃芩

升麻

甘草

炙

寒水石

煨各等分

右剉散每服五錢水二盞煎七分去滓食前服

治黃肉隨

三因方鮑氏方

脾腑臟溫病陰陽毒胃腑虛則為陰

邪所傷頭重頸直皮肉強痺膜脹色黃黑者

厚朴

姜製炒一兩半

白朮

陳皮

各一兩半

乾薑

炒

紫蘇

甘

草

炙

半夏

湯洗各三分

右剉散每服五錢水二盞煎七分去滓食前服

又方

三因方鮑氏方

脾腑臟溫病陰陽毒臟實為陽毒所傷蘊

熱結核起於喉頸之側布毒氣於皮膚分肉之中散入髮際下貫顙顙蓄熱不散色黃者

葛根

蒼朮

浸 油

升麻

白芷

桔梗

青皮

各一兩

大黃

半兩

右剉散每服五錢水二盞煎七分去滓食前服

治白氣狸

三因方 鮑氏方

肺腑臟溫病陰陽毒大腸腑虛為陰

邪所傷寒熱互作上氣欬逆大腸飧泄色皓皓白者

白朮

人參

各一兩

乾薑

炮

麥蘖

炒各三分

白茯苓

五

味子 肉豆蔻 草薺 烏梅 甘草

炙已上各半兩

右剉散每服五錢水盪半煎七分去滓食前服

又方

三因方鮑氏方

肺腑臟溫病陰陽毒臟實為陽毒所傷體

熱肌膚發斑氣喘引飲色昏白者

紫苑茸

一兩

梔子仁

升麻

前胡

各三分

石膏

煨半兩

葶藶

炒一分

杏仁

去皮尖

甘草

炙各半兩

右剉散每服五錢水二盪煎七分去滓食前服

治黑骨溫

三因方鮑氏方

腎腑臟溫病陰陽毒膀胱腑虛為陰

邪所傷裏熱外寒煩渴引飲反喜守火或腰脇滿痛  
小便赤黃而與脚俱黑

附子

炮去  
皮臍

茯苓

各一  
兩

山茱萸

細辛

山藥

澤

瀉

各半  
兩

麻黃

三  
分

杏仁

去皮尖  
一分

右劉散每服五錢水二盞煎七分去滓食前服

又方

三因方  
鮑氏方

腎腑臟溫病陰陽毒腎臟實為陽毒所傷

腰脇切痛不得轉動大小便閉澀小腹脹食冷則洞

泄色薰黑者

吳茱萸

黑牽牛

炒

桃仁

去皮尖

葶藶

杜仲

去皮剉

汁製炒

大黃

蒸各

絲斷

等分

右劉散每服五錢水二盞煎七分去滓食前服

治肝臟溫病陰陽毒頸背雙筋牽先寒後熱腰強急

縮目中生花

出千金方

桂心

一兩

白朮

芒硝

大青

梔子

各三兩

芎藭

五兩

石膏

生薑

各八兩

生地黄

香豉

各一升

右咬咀以水九升煮取三升分三服

治心腑臟溫病陰陽毒戰掉不定驚動

出千金方

大青

黃芩

梔子

知母

芒硝

各三兩

麻黃

四兩

玄參

六兩

石膏

生葛根

各八兩

生地黃

切一升

右咬咀以水九升煮取三升去滓下芒硝分三服

治脾腑臟溫病陰陽毒頭重頸直皮肉痺結核隱起

出千

金方

大青

羚羊角

升麻

射干

芒硝

各三兩

梔子

四兩

寒水石

六兩

玄參

八兩

普濟方

右咬咀以水七升煮取三升分三服

治肺腑臟溫病陰陽毒咳嗽連續聲不絕嘔逆

出千金方

麻黃 梔子 紫苑 大青 玄參 葛根

各三兩

桂心 甘草 杏仁 前胡

各四兩 石膏

八兩

右咬咀以水九升煮取三升分三服

治腎腑臟溫病身面如刺腰中欲折熱毒內傷

出千金方

茵陳蒿 梔子 芒硝 苦參 生葛

各三兩

各四兩

生

地黃 石膏

各八兩

葱白

豉

一升



右咬咀以水九升煮取二升半下芒硝分三服

大交泰丹 治陰陽二毒傷寒或因下早亡陽或致結  
伏胸膈四肢厥冷脈息俱無心躁如火或因冷物傷  
脾夾臍注痛生硬入胃中滿痞塞及發潮熱并治翻  
胃噦逆霍亂吐瀉小腸疝瘕脇肋氣痛但是陰陽不  
順惡候傷寒並治之每服一粒炭火內煨通赤良久  
取出放冷細研如粉米飲一盞煎至七分溫服不拘  
時隔半時辰再服甚效兼治小兒瘡疹倒壓依法服

半粒丹愈

金星石 銀星石 代赭石 太陰玄精石 雲

母石

白色成片子者

禹餘糧石

桂府滑石

各一兩

寒水石

吉州者一兩半

不灰木

色青黑性軟者一兩

右同入瓷瓶子內炭火半秤煅火耗一半取出放冷

研為細末糯米粥為丸如彈子大候乾依前法服

寒水石南人謂之軟石膏一方加麥飯石一兩

歸魂散

伏明濟總錄

治陰陽二毒不省人事

石膏

八兩

寒水石

四兩

附子

炮製去皮  
三兩

陽起石

三兩  
石膏寒

水石三味搗細研為末和入新礮內煨  
一伏時出紙鋪地出火毒入四味藥

乾薑

炮

麻

黃

去節各  
一兩

杏仁

二七枚去皮  
尖雙仁炒研

右搗研令勻瓷盒盛冷水調下二錢

霹靂散

一名黑  
散子

治陰隔陽煩躁不飲水

右用附子一枚炮熟取出用冷灰焙細研入真鴈茶

二大錢和勻為細末每服分作二服水一盞煎至

六分臨熟入蜜半匙取溫或冷服之須臾躁止得

睡汗出即差

黑龍丹 治陰陽二毒傷寒

右用舶上硫黃一兩以柳木槌研三兩日巴豆一兩  
和殼記箇數用二升鐺子一口先安硫黃鋪鐺底  
次安巴豆又以硫黃蓋之釀醋半升已來澆之盪  
子蓋合令緊密更以濕紙周回固濟縫勿令透氣  
縫紙乾更以醋濕之文武火熬常著人守之候裏  
面巴豆作聲數已半為度急將鐺子離火便入臼

中急搥令細再以少米醋并蒸餅少許再搥令冷  
可丸如鷄頭大若是陰毒用椒四十九粒葱白二  
莖水一盞煎至六分服一丸陽毒用豆豉四十九  
粒葱白二莖水一盞同煎吞一丸不得嚼破患經  
五六日方可服之食前喫切在度其病勢可下即  
與雖及日數病未傳入或未及其日病先在臟亦  
不可拘執矣有孕婦人亦許服或吐或瀉為候不  
可喫熟食或覺心頭空以溫白粥或服調氣湯散

補之欲辨陰陽二毒之病者但始得病唯看手足  
指冷者是陰不冷氣和者是陽若冷至指二三寸  
者病輕若冷至肘膝為病難理陰陽毒病亦無常  
也或初病便有毒或服藥經五六日以上或十餘  
日後不差變成其毒者其候身重背強咽喉痛飲  
食不下毒氣攻心心腹煩疼氣促四肢厥逆嘔吐  
體如被打面目青而體冷者陰症也陽毒則不然  
面目赤身壯熱或便膿血喉疼生班點如錦者是

也合時忌婦人猫狗見

破症奪命湯 治陰陽二毒傷寒症候不明下藥錯誤

致患人困重垂死七日以後十日以來可服此傳者云千不失一只一服不踰時見效汗自鼻上出儘是

應

方見傷寒門雜治類

丹砂圓

出活人書

治傷寒陰陽二毒相伏危惡形症

硝石

半兩

太陽石 舶上硫黃 水銀 太陰石

玄精石

各一兩

右為末先用無油銚子以文武火炒下諸藥末令一  
如灰色研如粉麴生薑自然汁浸蒸餅為丸如棗  
豆大每服五丸龍腦牛黃生薑蜜水下壓燥也若  
陽毒素湯下陰毒葱湯下不得於屋底炒一方無  
太陽石

奪命丹

出王氏  
博濟方

治陰陽二毒氣衝心

硃砂

二兩

金箔

八十片

膩粉

半兩

巴豆

八十筒紙  
裏出油

黃蠟

二兩

右為末煉蠟為丸如鷄頭大如有患者以膩粉一錢



米飲一盞調下如人行一里已來其藥動下惡物  
如藥在其中取出掘一地坑埋三伏時取出除却  
上面黑物以麝香裹養之如更用時擘為兩處重  
為丸一粒可療五七人神聖之功卒難序述

青蒿散 治陰陽二毒傷寒及肢體疼痛

右用青蒿八九月候成實多採去枝梗以童子小便  
浸三兩日漉起酢乾日晒為末每服三錢水一盞  
烏梅一箇同煎七分溫服

陰毒

論

夫陰氣獨盛陽氣暴衰陽為陰所勝內外皆陰故成陰毒傷寒有初得病便成陰毒者有服湯藥經五六日以上不瘥變成陰毒者以病本屬陰自服寒藥過多或臟腑內外受寒陰氣轉盛陽氣不復所致其候四肢逆冷臍腹築痛身如被繫嘔吐下利其脈沈細而疾者是也陰毒已深疾勢困重六脈附骨取之有按之即無一息八至已上或不可數宜用葱熨法灼艾法傷寒初病

一二日便結成陰毒或服藥六七日已上至十日變成陰毒身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心心下鞕強氣短不得息躁渴虛汗或時鄭聲嘔逆下利身如被杖唇青面黑四肢厥冷其脈沈細緊數仲景云此陰毒之候五日可治至六七日不可治也陰毒甘草湯主之始得陰毒云陰毒本因腎氣虛寒因慾事或食冷物後傷風內既伏陰外又感寒或先感外寒而伏內陰內外皆陰則陽氣不守遂發頭痛腰重腹痛眼睛疼身體倦

怠而不甚熱四肢逆冷額上及手皆冷汗不止或多煩  
渴精神恍惚如有所失三二日間或可起行不甚覺重  
診之則六脈俱沈細而疾尺部短小寸口或大六脈浮  
大或沈取之大而不甚疾者非陰症也若服涼藥過多  
則渴轉甚躁轉急有此病症者急服還陽退陰二藥即  
安惟補虛和氣而已宜服正元散退陰散五勝散陰症  
不宜發汗如氣正脈大身熱而未差用藥出汗無妨  
陰毒為病手足冷腰背強臍腹築痛嘔吐下利身如被

杖脈細欲絕此由腎氣虛寒外傷風冷或因冷物傷脾  
蓋脾為太陰內外皆陰則陽氣不守遂成陰毒四肢逆  
冷額上手背冷汗不止或多煩渴精神如失故岐伯曰  
陰勝則身寒汗出身常清數慄而寒寒則厥宜服溫藥  
以復其陽氣或於氣海關元灸之 又陰毒漸深積陰  
感於下則微陽消於上其症候沈重四肢逆冷腹痛轉  
甚或咽喉不利或心下脹滿結硬躁渴虛汗不止或時  
狂言指甲面色青黑六脈沈細而一息七至以來有此

症者速宜於氣海或關元二穴灸三四百壯以手足和煖為效仍服金液丹來甦丹玉女散還陽散退陰散

又陰毒沈困候云沈困之候與前漸深之候皆同而更加困重六脈附骨取之方有按之即無一息八至已上或不可數也至此則藥餌難為功矣但於劑中灼艾如半棗大三百壯以來手足不和煖者不可治也偶復和緩則以前硫黃及熱藥助之若陰氣散陽氣來即漸減熱藥而和治之以取差也 詩曰陰毒傷寒身體重背

強眼痛不堪任小腹急痛口青黑毒氣衝心轉不禁四肢厥然惟思吐咽喉不利脈細沈若能速灸臍輪下六日看過見喜神陰毒身如擊撲然疾沈汗渴痛臍咽身班面赤多煩躁陽毒狂言洪數弦陰氣獨盛陽氣暴絕則為陰毒身冷有汗其脈沈細而疾是也沈而右疾者非初病遽然而成者有服藥數日變而成者蓋以腎氣極損生冷傷脾內已伏陰外又感寒或先感外寒後伏陰於內內外皆陰陽氣不守故爾陽氣獨勝陰氣暴絕

則為陽毒身熱無汗其脈弦洪促數是也有初病遽然  
成者蓋酒麪過多丹砂僭躁腸胃極熱致之或病症屬  
陽誤投溫藥助熱為邪內外皆陽陰氣不守故爾陰陽  
二毒皆有頭疼微利之症

抑陰用熱  
抑陽用寒

固有條例然此二

毒隨氣逆上結伏於胸中皆令人心下痛硬非常法所  
能通也當急作規摹以泄之陰毒泄則陽氣復陽毒泄  
則陰氣復陰陽升降榮衛流行自然大汗而解矣若心  
下已結延至六七日間斷不可活外症治法詳於後篇



陰毒外症面目唇爪青黑口開氣短咽喉不利手足厥  
冷身不甚熱痛重如打撲或數慄而寒頭目俱疼腰重  
背強毒氣攻心心下堅悶腹中絞痛外腎並臍下冷硬  
額上及手背間冷汗不止嘔吐下利煩渴陰極發躁精  
神恍惚言語醒醒聲音鄭重舌上黑色陰病回陽服藥  
未透亦須外借火氣但無迫脅也生薑並良薑皆能散  
寒邪發越陽氣亦要藥也陰毒沈細而其疾身冷有汗  
可與之陰毒甘草湯及白朮附子散正陽散肉桂散回

陽丹返陰丹天雄散正原散退陰散金液散皆可選而用之則陽氣復而大汗解其汗醫之能精於此用藥療症則無不愈矣大師陳北山方訣治陰毒心下結伏按之極痛大小便閉澀累日用藥不下但出氣稍煖亦可療治急取巴豆肉十粒研爛如麪一錢許捻作一餅堅實安頓臍心用小艾炷灸五七壯覺腹中鳴良久自通利其次用葱白一束緊扎切作數餅灸令溫實貼於臍下以熨斗火熨其上續又易之漸覺體溫即以五積散

二錢附子末一錢薑七片棗二枚鹽少許水一大盞煎七分溫溫服連併二三劑即汗出而瘥又法以大蒜一枚搗研捏作餅子灸熱置於臍心灸十壯大小便即通陰毒已深則灸氣海關元二穴以手足和為效仍以前項藥濟之若六脈附骨疾勢困甚者臍中可先艾後葱法方訣詳具于前凡治陰毒得陽氣乍復復者皆生煩躁切勿誤投涼藥躁甚與逆陰丹輩陰症太陰少陰厥陰皆屬陰症也太陰者脾也少陰者腎也厥陰者肝

也何謂太陰症太陰脾之經主胸膈臍脹甲乙經云邪  
生於陽者得之風雨寒暑邪中於陰者得之飲食居處  
陰陽喜怒又曰賊風虛邪者陽受之飲食不節起居不  
時者陰受之陽受之則入腑陰受之則入臟入六腑則身熱  
不時上為喘呼入五臟則臍滿閉塞下為飧泄久為腸  
癖何謂少陰症少陰腎之經主脈微細心煩但欲寐或  
自利而渴又問經云一二日少陰病者何也謂初中病  
時腠理寒便入陰經不經三陽也

傷寒雖是三陰二陽  
大抵發於陽則太陽

發於陰則少陰也此二經為表裏其受病最為多陽明太陰受病頗稀至於少陽厥陰肝膽之經又加少焉凡病一日至十二三日太陽症不罷者但至太陽有初得病便見少陰症者直攻少陰亦不必先自太陽次傳而至蓋寒氣入太陽經即熱而惡寒入少陰經只惡寒而不

發熱也三陰中寒微則理中湯稍厥或中寒下利即乾

薑湯

手足指頭微寒冷謂之清病有此未可喫四逆蓋疾輕故也只可服理中乾薑之類

大段重

者用四逆湯無脈者用通脈四逆湯也何謂厥陰症厥陰肝之經主消渴氣上衝心中疼熱飢不欲食食則吐虵下之利不止也若陰氣獨盛陽氣暴絕則為陰毒其

症四肢逆冷臍腹築痛身如被杖脈沈疾或吐或利當  
急灸臍下服以辛熱之藥令陽氣復而大汗解矣古人  
云辛甘發散為陽謂桂枝甘草乾薑附子之類能復其  
陽氣也微用辛甘甚則用辛苦陰極發躁陰症似陽學  
者當以脈別之

方

附子散 治陰毒傷寒唇青面黑身重背強四肢逆冷

或因服冷藥過度心腹脹滿昏沈不識人

一名桂附散

附子

三分炮製  
去皮臍

桂心

白朮

當歸

劉微炒  
各半兩

半夏

湯洗七  
遍去滑

乾薑

炮製

天南星

炮製木香

各一分

右搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎

至六分去滓不計時候熱服衣覆取汗如人行十

里未有汗再服

治陰毒傷寒四肢逆冷身體疼痛或時心頭結硬宜服此方

附子

炮製去  
皮臍

白朮

甘草

炙微  
赤劉

麻黃

去根節已桂  
上各一兩

心

半  
兩木香

三分

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服衣覆取汗如人行十里未有汗再服

烏頭散 治陰毒傷寒四肢厥冷脈候沈細心腹脹滿腹中疔痛咽喉不利遍身疼痛

川烏頭

一兩炮製去皮臍

白朮

赤芍藥

各三分

麻黃

去根節

桂心

枳殼

麩炒微黃去穢

當歸

剉微炒

川椒

去目及閉口者微炒去汗

乾薑

炮製剉已上各半兩



右搗麝羅為散每服五錢以水一大盞入生薑半分  
煎至五分去滓不計時候熱服衣覆取汗如人行  
十里未有汗再服

麻黃散

出聖惠方

治陰毒傷寒二三日不得汗煩躁

麻黃

去根節

防風

去蘆頭各一兩

乾薑

炮製剉

桂心

川烏頭

炮製去皮  
臍各半兩

右搗羅為散每服不計時候以熱酒調下二錢衣覆  
取汗如人行十里未有汗再服

迴陽散

出聖惠方

治陰毒傷寒

川烏頭

炮製去皮臍

益智子

青橘皮

湯浸去白穢焙

桂心

乾薑

炮製剉各半兩

麻黃

一兩去根節

右搗為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至

六分去滓不計時候稍熟服衣覆取汗如人行十

里未有汗再服

白朮散

出聖惠方

治陰毒傷寒心胸滿悶喘促四肢厥逆

白朮

前胡

去蘆頭

附子

炮製去皮臍

訶梨勒皮

厚朴

去粗皮塗生薑汁  
炙令香熟各一兩

桂心 三分

甘草 炙微赤剉

五味子 乾

薑

炮製細剉  
各半兩

右麤搗羅為散每服四錢以水一中盞煎至六分去

滓不計時候稍熱服如人行十里未有汗再服

天雄散

出活人書

治陰毒傷寒身重背強腹中痞痛咽喉不

利毒氣攻心心下堅強短氣嘔逆唇青面黑四肢厥

冷其脈沈細

天雄

炮製去  
皮臍

肉桂

去粗皮

厚朴

去粗皮塗生薑汁炙  
令香熟已上各一兩

麻黃

去根節

當歸

剉微炒

白朮

半夏

湯洗七過去滑各半兩

川

椒

去目并閉口者微炒去汗一分乙學發明用一錢

乾薑

炮製剉三分乙學發明用生薑

二錢陳橘皮

湯浸去白膜焙三分乙學發明用一錢

右搗麤羅為散每服五錢以水一大盞入生薑半分

棗三枚煎至五分去滓不計時候稍熟服如人行

十里未汗再服

吳茱萸散

出聖惠方

治陰毒傷寒迴陽

吳茱萸

湯浸七過焙乾微炒

麻黃

去根節

肉桂

去皺皮各一兩

厚朴

二兩

去粗皮塗生

半夏

湯洗七過去滑

乾薑

炮製

附子

炮製去皮臍各

姜汁炙令香

三白朮

細辛

天南星

炮製

木香

各半兩

右搗篩為散每服五錢以水一中盞入生薑半分煎

至五分去滓不計時候熱服衣覆取汗如人行十

里未汗再服

正陽散

出活人書

治陰毒傷寒面青張口出氣心下硬身不

熱只額上有汗煩渴不止舌黑多睡四肢俱冷

附子

一兩炮製去皮臍

皂莢

一挺去皮塗醋炙令黃色去子

乾薑

炮製

甘

草

灸微赤剉  
各一分

麝香

一錢細  
研入

右搗細羅為散每服二錢以水一中盞煎至五分不

計時候和滓熱服

治陰毒傷寒項背強心神煩宜服此方

出聖  
惠方

麻黃

去根  
節

附子

炮製去  
皮臍

澤瀉

半夏

湯洗七  
遍去滑

肉桂

去微  
皮

甘草

灸微  
赤剉

乾蝎

微  
炒

乾薑

炮  
製

天南星

炮製已上  
各半兩

右搗細羅為散每服二錢以水一中盞入生薑半分

棗三枚煎至六分去薑棗不計時候和滓熱服

前胡散

出聖惠方

治陰毒傷寒四肢厥逆頭痛心躁胸中結

實兩脇妨悶

前胡

去蘆頭

桔梗

去蘆頭各三分

檳榔

桂心

木香

當

歸

劉徽炒

青橘皮

湯洗去白穢各半兩

訶梨勒皮

厚朴

去粗皮塗

生姜汁炙令

香熟各一兩

右搗散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓不計時候熟服

四逆湯

出聖惠方

治陰毒傷寒脈候沈細四肢逆冷煩躁頭

痛

乾薑

炮製

附子

炮製去  
皮臍

桂心

甘草

白朮

當

歸

劉微炒已  
上各半兩

右搗篩為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不

計時候稍熱頻服

治陰毒傷寒心間煩躁四肢逆冷宜服此方

名白朮散  
出活人書

川烏頭

炮製去  
皮臍

桔梗

去蘆  
頭

附子

炮製去  
皮臍

白朮

細

辛

各一  
兩

乾薑

半兩炮  
製判



右搥麤篩為散如患一日兩日者溫酒調下一錢如是三四日至五日者用藥末二錢以水一中盞煎至六分不計時候稍熱和滓頻服

治陰毒傷寒四肢厥逆胸膈不利宜服此方

附子

炮製去皮臍

乾薑

炮製剉

肉桂

去皺皮

人參

去蘆頭

赤茯苓

苓

白朮

木香

五味子

厚朴

去粗皮塗生薑汁炙令香

熟各

一兩

訶梨勒皮

一兩半

甘草

半兩炙微赤剉

右搥篩每服四錢以水一中盞入生薑半分葱白一

莖煎至六分去滓不計時候稍熟頻服

肉桂散 治傷寒服冷藥過度心腹脹滿四肢逆冷昏

沈不識人變為陰毒

肉桂

去皺皮

白朮

木香

高良薑

剉

厚朴

去粗皮塗生薑

汁炙令香熟各三分  
乙學發明各用三錢

赤芍藥

陳橘皮

湯浸去白穢焙

附

子

炮製去皮臍

前胡

去蘆頭

當歸

剉微炒

人參

去蘆頭各一兩

吳茱

黃

半兩湯浸七遍焙乾微炒

右搗羅為散每服四錢以水一中盞入棗三枚煎至

六分去滓不計時候稍熱頻服

人參散 治陰毒傷寒手足逆冷心下煩滿

人參

去蘆頭

木香

附子

炮製去皮臍

桂心

乾薑

炮製

當歸

劉微炒

吳茱萸

湯浸七遍焙乾微炒

檳榔

已上一兩

右咬咀為散每服四錢以水一中盞入棗三枚煎至

六分去滓不計時候稍熱服

治陰毒傷寒頭痛四肢不和心腹氣悶宜服此方

附子

炮製去皮臍

乾薑

炮製

陳橘皮

湯浸去白穢焙

桂心

檳

榔

已上各一兩

甘草

三兩炙微赤剉

右咬咀為散每服四錢以水一中盞入棗子三枚煎

至六分去滓不計時候稍熟頻服

桂心散 治陰毒傷寒項直脚冷百節疼痛

桂心

麻黃

去根節

附子

炮製去皮臍各三兩

甘草

炙微赤剉

赤芍

藥

乾薑

炮製剉

枳殼

麩炒黃去穢

杏仁

去皮尖雙仁麩炒微黃各半兩

柴胡

一兩去苗

右咬咀為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎

至六分去滓不計時候稍熱頻服汗出為度

迴陽丹 治陰毒傷寒面青手足逆冷心腹氣脹脈候

沈細

乾薑

一分炮製

硫黃

細研入

草澄茄

吳茱萸

湯洗七遍焙乾

微炒附子

炮製去皮臍

木香

桂心

一方去桂心

乾蠍

已上各半兩

右搗羅為末酒煮麴糊丸如梧桐子大每服不計時

候生薑湯下三十九頻服參以熱酒一盞投之衣

蓋取汗愈一方丹砂為衣無桂心

正陽懷香丸

治陰毒傷寒四肢逆冷心下痛硬氣欲

絕者

懷香子

微炒

附子

炮製去皮臍

天南星

炮製

硫黃

細研

丁香

木香

吳茱萸

湯浸七遍焙乾微炒

預知子

桂心

已上一兩

右搗羅為末和研了藥令勻醋煮麪糊丸如彈子大

每服一九研碎炒生薑熟酒下良久煎葱白艾湯

投之不計時頻服

來蘇丹

治陰毒傷寒

一名正陽丸

硫黃 硝石 太陰玄精石

已上各一兩

右都研細於瓷瓶中盛以瓦子蓋瓶口用黃泥固濟以炭大半斤養令火盡即出之更研入粉用湯浸蒸餅和九如梧桐子大每服不計時候熱酒下三九至五九衣蓋取汗

黑聖散 治陰毒傷寒發汗

川烏頭

三個每個劈作四片

吳茱萸

六兩湯浸七遍焙乾

右先掘地作一坑子築令淨潔以大火燒赤淨掃去

灰後下茱萸次下烏頭安在上面用好醋一大碗  
旋旋澆入坑子內以盡為度後以瓦盆蓋之待冷  
取出搗細羅為散每服以生薑熟酒調下一錢汗  
出立差

治陰毒傷寒頭痛心躁手足厥冷宜服此方

右用附子一兩炭火內燒令黑色勿令全過取出用  
盆子蓋之冷細研水磨沈香一分煮稀粥飲不計  
時候調下二錢衣覆取汗如人行十里未有汗再



服

治陰毒傷寒四肢逆冷宜熨之

右用吳茱萸一升以酒拌令勻濕以熟絹袋二枚盛  
蒸令極熟取熨脚心候氣通暢勻煖即停熨若以  
湯煎溫藥洗以接四肢亦可

升麻鼈甲湯

出千金方

陰毒之為病面目青身痛如被杖咽

喉痛五日可治七日不可治升麻鼈甲湯去雄黃蜀

椒主之

升麻

二兩

當歸

一兩

蜀椒

炒去汗  
一兩

鼈甲

手指大  
一片炙

甘草

二兩

雄黃

半兩  
研

右以水四升煮取一升頓服之老小再服取汗肘後  
千金方陽毒用升麻湯無鼈甲有桂陰毒用甘草  
湯無雄黃

陰毒甘草湯

一名陽毒  
升麻湯

治傷寒初得病一二日便結成

陰毒或服藥經旬以上變成陰毒身重背強腹中絞  
痛咽喉不利毒氣攻心心下堅強短氣不得息嘔逆

唇青面黑四肢厥冷其脈沈細身如被擊咽喉痛五

六日可治至七日不可治

出活人書

甘草

炙

升麻

當歸

炙各半兩

雄黃

研一兩

桂

去粗皮半兩

蜀

椒

去目及閉口者炒出汗一分

鼈甲

炙去裙襴一兩半醋

右除研外剉如麻豆每服五錢以水一盞半煎至八

分去滓溫服如人行五里更進一服溫覆取汗毒

當從汗出未汗再服千金方無桂雄黃

正陽湯

出聖濟總錄

治陰毒傷寒上氣喘促

附子

炮製去皮  
時一兩

桂

去粗皮  
三分

乾薑

炮半兩

右剉如麻豆大每服五錢以水一盞煎至半盞去滓

食前溫服之

回陽發表湯

出聖濟  
總錄

治陰毒傷寒

附子

炮製去皮  
臍

桂

去粗皮

人參

澤瀉

各半兩

乾薑

炮半兩

夏

湯洗七遍  
炒令乾

天南星

炮

甘草

炙各一分

右剉如麻豆大每服三錢以水一中盞入生薑半分

拍碎棗二枚劈破同煎至七分去滓食前溫服

附子湯

出活人書一名大附子當歸散

治陰毒傷寒為病手足冷腰背

強頭疼腹痛或煩渴精神恍惚額手背時出冷汗聲  
鄭重爪甲唇面色青黑多因脾腎虛虛寒伏陰重感  
於寒所致或因服冷藥過多心腹脹滿昏不知人婦  
女血室痼冷沈寒赤白崩漏臍腹疔痛一切陰盛陽  
虛並宜服之

附子

炮製去皮  
臍三分

桂

去皮  
粗

當歸

切  
焙

白朮

各半  
兩

半夏

湯  
浸

七遍

乾薑

炮各  
一分

去滑

右剉如麻豆大每服三錢以水一盞入生薑三片煎至六分去滓熱服不拘時衣覆取汗如人行十里未汗再服

定命湯

出聖濟總錄

治陰毒傷寒目赤唇焦頭疼煩渴面色

黑赤而身惡寒

附子

炮製去皮臍二兩

高良薑

白朮

乾薑

炮各一兩

右剉如麻豆大每服三錢用水一盞煎至五分去滓不計時候溫服未服藥前先飲酒使醺醺後服藥

如思食即與酒粥喫不得妄食他物若小便出血

是陰毒去矣

桂附湯

出聖濟總錄

治陰毒傷寒

桂

去粗皮一分

附子

去皮臍生用半兩

丁香

吳茱萸

湯淘三遍焙乾

炒各半分

右剉如麻豆大每服二錢以水一盞入生薑半分拍

碎同煎至七分溫服

回陽散

出聖濟總錄

治陰毒傷寒

硫黃

一兩

寒水石

三分

硝石

半兩

右入砂瓶子內盛以瓦蓋瓶口通用黃泥固濟陰乾

用炭火五斤煨令火盡研如粉每服一錢以溫水

調下

黑神散

出聖濟總錄

治陰毒傷寒

附子

三兩去皮臍燒令烟盡

麻黃

去節一兩桂去粗皮半兩

右搗羅為細散每服二錢以蜜湯調下

來蘇丹

出聖濟總錄

治陰毒傷寒面青手足冷身如被擊



太陰玄精石 硫黃 硝石 白礬 水銀 各一分

右同研令水銀不見星入瓷合子內燒通赤粟米飯和丸如小豆大每服三丸溫水下

四逆散 出聖濟總錄 治傷寒陰毒手足厥身冷脈細

太陰玄精石 三分末 硫黃 一分兩 不灰木 盆硝 各一分

右研為細末入在銚子內以盞子蓋周回用濕紙閉縫安火上紙乾為度取出細研入龍腦半錢乾薑末半兩拌勻每服半錢以冷艾湯調下肌體煖是

驗一方去不灰木加附子

退陰湯

出活人書

治陰毒傷寒手足厥面多青腹中疔痛兼

治陰毒欬逆等疾

烏頭

炮製去皮臍

乾薑

炮各半兩

右麤搗篩炒令轉色放冷每服二錢以水一盞鹽一

捻煎至半盞去滓溫服一方云脈沈細頭痛腰重

小小傷冷每服一字入正元散同煎入鹽一捻陰

毒症欬逆煎一服細細熱押之便止

還陽湯 治傷寒陰毒四肢厥冷時有汗

不灰木

一兩

延胡索

半兩

太陰玄精石

一分

右麤搗篩每服二錢以水一盞葱白一寸同煎至六

分去滓不計時溫服

退陰丸 治傷寒伏陰手足厥冷肌膚不熱

硫黃

半斤生

太陰玄精石

三兩煨

右用柳椎細研為末水浸炊餅和丸如梧桐子大每

服五十丸煎艾湯下日三

夜光丹 治傷寒陰毒四肢逆冷面青胸膈不利嘔噦

虛煩

硫黃

研

太陰玄精石

研

硝石

研

各一兩

附子

炮製去皮  
臍者一兩

生去皮  
者半兩

右先將玄精硝石二味於鐵銚子中慢火熬候勻熟  
以匙於中心挖作坑子內硫黃候鎔攪勻放冷研  
細別搗羅生附子為細末入研者藥合研勻以軟  
爛粳米飯和丸如梧桐子大每服五丸冷艾湯下

附子回陽散 治陰毒傷寒面青四逆及臍腹痛身

體如冰并療一切卒暴冷氣

右用附子二枚炮製去皮臍搥為細散每服三錢取  
生薑自然汁半盞冷酒攪勻共一盞調服更以冷  
清酒一盞送下相次更進一服良久臍下如火遍  
身和煖為度

太陽丸 治傷寒陰毒四肢厥逆脈息微細

硫黃

研

附子

炮製去皮

臍各一兩

右搥羅為末酒煮麪糊為丸如梧桐子大每服十九至十五丸煎艾鹽湯下不計時候

回陽蕒散 治陰毒傷寒四肢厥冷脈候微細心胸痞

悶

天南星

二兩酒浸七日取出剉炒令黃

附子

炮製去皮臍一兩

右搥羅為散每服二錢以酒一盞半同煎至六分溫服不計時候

定命丸 治陰毒傷寒

硫黃

研

吳茱萸

湯浸焙乾  
炒推為末

硝石

研各  
一兩

巴豆

去心皮  
膜半分

右一處研令勻軟飯和丸如彈子大每服先以椒煎湯浸手良久男左女右執之一丸汗出即瘥婦女

妊娠傷寒並宜使

吳茱萸湯

治傷寒陰毒

吳茱萸

湯洗炒  
乾一兩

白附子

天南星

柴胡

去苗

鼈甲

去裙襴  
醋煮

前胡

去蘆  
頭

細辛

去苗  
葉

羌活

去蘆  
頭

黃耆

剉

乾

薑

炮  
枳殼

去穢  
炒

陳橘皮

湯浸去  
白焙

赤芍藥

厚朴

去  
麁

皮生薑

白檀

五味子

桔梗

各半

蒼朮

米泔浸一宿去

汁炙

皮

莎草根

當歸

切焙

芫薺

麻黃

去根節湯煮掠去沫各一兩

甘草

炙一兩半

右剉碎入淨鍋內慢火炒令黃再麤搥篩每服三錢

以水一盞生薑三片同煎至七分去滓溫服不拘

時候

順元煑散 治傷寒陰盛裏寒脈細手足厥冷

烏頭

炮製去皮臍二兩

附子

炮製去皮臍

天南星

炮製去皮臍各一兩

木



香

半兩

右搗羅為散每服一錢以水一盞煎至六分溫服大體此散能溫衰脈遲細沈伏手足冷毛髮恂慄傷寒裏症之類大啜三兩杯當手足溫或汗乃愈今世醫多此散和一切氣通利血絡人病脾瘡用紫金丸逐下仍服此散紫金丸用硫黃鍼砂各三錢以鐵粉五錢膩粉十五錢粟米飯丸如皂莢子大每服一九乳香湯下氣實服一九半至二九

葱薤湯 治陰毒傷寒出汗

葱白 薤白 荊芥穗

竹茹

各一握

豉

去皮半升

生薑

一分 蜀椒 去目并開口炒出汗四十九粒

右咬咀如麻豆大每服五錢以酒二盞煎十數沸去滓又別取此藥二十錢以沸湯一升沃之候通手淋背上了即服前藥酒蓋覆出汗仍煮葱薤粥投之汗即出差

附子湯 治陰毒傷寒頭痛眼疼心中悶亂身體沈重

四肢俱冷精神恍惚脈候沈細欲得冷水飲之必危

附子

炮裂去皮  
臍二枚

桂

去麋皮  
半兩

當歸

切焙  
半兩

乾薑

炮裂  
二分

麻

黃

去節先煎掠去  
沫焙乾半兩

右麋搗篩每服五錢以水一盞半煎至七分去滓空  
心頓服以衣覆如人行五里再一服少頃生薑煮  
熟稀粥投身體四肢自然汗出須臾頭輕目明婦  
人病加赤芍藥半兩神效

迴生神膏

出濟生  
拔萃方

治男女陰毒傷寒外接法

牡蠣

煨粉

煉粉

乾薑

炮製各一錢

右為細末男病用女唾調手內擦熱緊掩二卵上得汗出愈女病用男唾調手內擦熱緊掩二乳上得汗出愈卵與乳男女之根蒂坎離之分也陰症大小不通及諸雜病陰候大小不通者並宜此外法治數日不通為急非急勿用

治陰毒呃逆方

川烏頭

乾薑

附子

已上俱炮

肉桂

甘草

炙

芍藥

半夏 吳茱萸 陳皮 大黃

右各等分為末每服一錢水一盞生薑三五片煎至七分去濁滓取清熱服

玉女散

出十便良方

治陰毒氣攻上腹痛四肢逆冷惡候並

治之

右用川烏去皮臍冷水浸七日後薄切曝乾紙裹盛有患者取研末一大錢入鹽一小錢水一盞半煎至七分通口服壓下陰毒所注與猪血相似未已

良久再進一服

還陽散

出十便良方

治陰毒面色青四肢逆冷心躁腹痛

右用硫黃末新汲水調下二錢良久或寒一起或熱一起更看緊慢再服汗出差

陰毒甘草湯

出千金方

治傷寒初病一二日便結成陰毒身

重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心心下堅強短氣不得息嘔逆唇青面黑四肢厥冷其脈沈細緊數仲景云此陰毒之候身如被打五六日可治七日不

可治也

甘草

升麻

各半兩

當歸

蜀椒

各六錢

鼈甲

一兩

右咬咀以水五升煮取二升半分三服如人行五里

須臾進一服溫覆發汗毒當從汗出則愈若不汗

出則不除重作服仲景方云去蜀椒

逐陰丹

出活人書

治陰毒傷寒心神煩燥頭痛四肢逆冷面

青腹脹脈沈者

硫黃

通明五兩別研

消石

別研

太陰玄精石

各二兩別研

乾薑

炮

桂心

各半兩

附子

炮半兩

右用鐵銚先鋪玄精次下硝末各一半中間鋪硫黃末又將二藥餘末蓋以上下蓋合著熟炭火三斤燒令得所勿令烟出急取瓦盆合著地上四面灰蓋勿令烟出候取出研細入後藥為末同研勻米糊丸如梧桐子大每服二三丸煎艾湯下頻服汗出為度未退乃大著艾炷灸臍下丹田氣血海更不退則以葱餛熳之



葱白熨法

出活人書

治虛氣腸脫體冷無脈氣息欲絕不省

人事及傷寒陰厥服藥不效者

右用葱一束以索纏如餅餡大去根葉唯存白長二寸許先以火煨一面令通熟勿至灼人方以熱處著病人臍下上以熨斗盛火熨之令葱餅熱氣透入腹中更作三四餅遇一餅壞不可熨即易一餅候病醒手足溫有汗乃差更服四逆湯以溫其利昔曾有患傷寒冥冥不知人四體堅冷如石藥不

可入用此遂差一方用醎醋拌麩炒熟注布袋中  
蒸熨比上法尤佳

治陰毒傷寒破傷風

出神效方

草烏

七個文武火燒熱去蘆頭

麝香

半錢

硃砂

一錢

右為細末每服一字以熱酒調下食前服之汗出為  
度忌豬兔魚鼈殺羊肉

治陰毒傷寒

出神效方

右用芥末新水調膏藥貼臍上汗為效

又方

出神效方

牡蠣

乾薑

各等分

右為末新水調塗手心握外腎汗出為度

治陰毒傷寒

出儒門事親

右用煮百合濃汁服一升良

治陰毒傷寒

右用烏藥子一合炒令黑烟起投於水中煎取三五

沸服一大盞候汗出回陽立差

代灸陰臍膏

出濟生  
拔萃方

病者因飲酪水及食生物下利紫

黑血十餘行脾胃受寒溫毒與六神平胃散半兩加  
白朮三錢以利腰臍間血一服愈潔古云煩滿囊縮  
可灸陽陵泉在膝下一寸外臚是也陰病在內活人  
定以返陽丹當歸四逆湯及加吳茱萸生薑湯又以  
臍下一寸灸之以臍下各四邊一寸三處齊灸之極  
則二寸石門急灸之仍與前藥予恐不任藥與灸者  
別立代灸法

附子 馬蘭子 蛇床子 木香 吳茱萸 肉

桂

右各等分為細末可用白麵一匙藥末一匙或用各  
半匙生薑自然汁煨成膏攤紙上圓三寸許貼臍  
下關元氣海自晚至曉火力可代灸百壯腰痛亦  
用貼之

破陰丹 治頃年鄉人李信道得疾六脈沈不見深按  
至骨則弱緊有力頭疼身溫煩燥指赤背冷中滿惡

心更兩醫矣醫者不識止供調氣藥予因診視曰此陰中伏陽也仲景法中無此症也人患此者若有熱藥以助之則為陰邪隔絕不能導引真陽返生客熱用冷藥則所伏真火愈見消鑠須用破陰散導達真火之藥使火升水降然後得汗而解予授此藥二百粒作一服冷鹽湯下不半時煩燥狂熱手足燥擾其家大驚予曰俗所謂換陽也須臾稍定畧睡已中汗自昏達旦方止身涼而病除

硫黃

水銀

各一兩

陳皮

青皮

去白各半兩末

右先將硫黃銚子內鎔次下水銀用鐵杖子打勻令無星傾入黑茶盞內研細入二味勻研同厚麪糊丸如梧桐子大每服三十九丸如煩燥冷鹽湯下陰症冷艾湯下

霹靂散

出濟生拔萃方

治陰盛隔陽傷寒其人必躁熱而不欲

飲水者是

右用附子一枚燒為灰存性為末蜜水調下為一服

而愈此逼散寒氣然後熱氣上行而汗出乃愈

又方

出肘後方

治陰毒傷寒口鼻冷者乾薑桂各一方溫酒

三合服之當大熱差凡陰陽二毒不但初得便爾或一二日變作者皆以冷藥治之得此病多死治熱不解而下痢困篤欲死者服此大青湯方

大青

四兩

甘草

三兩

膠

二兩

豉

八合

赤石脂

三兩

右以水一斗煮取三升分三服盡更作日夜兩劑愈

又方

出肘後方



右用梔子十四枚薤白一把水五升煮取三升半分  
為三服

又分

出肘  
後方

右用龍骨半斤搥碎以水一斗煮取五升使極冷稍  
飲其間或得汗即愈矣

又方

出肘  
後方

右用黃連二兩熟艾如鴨卵大以水二升煮取一升  
頓服立止天行諸痢悉主之

又方

出肘後方

天行諸痢悉主之

黃連

三兩

黃蘗

當歸

龍骨

各二兩

右以水六升煮取二升去滓入蜜七合又火煎取一升半分為三服效

又方 治陰毒傷寒及重感冒風寒頭疼拘急

右用口嚼生薑一大塊用二三錢熟酒調服一大盞涎吐汗出即愈

又方 治陰症

右用黑豆一合炒焦酒浸熱飲一碗豆不用被蓋汗

出即愈

老君神白散

出余居士  
選奇方

治傷寒陰證

白朮

附子

各二兩

桔梗

細辛

甘草

各一兩

右為細末白湯點服

陰毒熏法

出活  
人書

治陰毒逆冷囊縮者

右用大豆三升炒令極熱先以淨盆桶內置熱醋三升旋扶病人坐桶上熏少時却以熱豆傾桶中熏

之有頃囊下却以陰症藥服之

回陽丹

出衛生寶鑑

治陰毒傷寒手足厥冷

牡蠣

燒

不灰木

燒

良薑

切炒

川烏頭

炮

白芍藥

各二錢

麝香

少許

右為細末每用一錢男病女唾津調塗外腎女病男

唾津調塗乳上

手陽丹

出衛生寶鑑

治陰毒傷寒手足厥冷指甲青色體冷

脈沈細而微神效

右用青葱四五枝陳蜂窠四五箇燒存性為末用青葱搗如泥丸如桐子大手心內握定用手帕緊繫定須臾汗出以綿被覆蓋蓋如手心熱甚休教解開如服藥時先服升麻湯五錢出子連鬚葱三枝生薑五片水二大盞煎至一盞去滓溫服以被覆之汗出愈

海藏已寒丸

出濟生拔萃方

治陰症服四逆背冷中發躁而煩

渴者或數日大便閉小便澁赤服此上不躁大小便

自利

肉桂

茯苓

錢各五

良薑

烏頭

錢各七

附子

炮

乾薑

炮  
芍藥

茴香

炒各一兩

右為細末糊為丸如桐子大溫酒下空腹食前五七  
十九八九十九亦得酒醋為糊俱可

麻黃升麻湯

出清生  
拔萃方

治傷寒陰結不大便六七日大下

之結去脈當浮則愈及寸脈沈而遲手足厥冷寸脈  
沈而遲者少陰本脈故主咽喉不利唾膿血四肢厥

者為厥陰利不止為太陰為難治溫之則咽痛不可  
溫也

麻黃

二兩

升麻

當歸

各一兩一分

知母

三分

麥門冬

一分  
去心

黃芩

三分

乾薑

芍藥

桔梗

石膏

茯苓

甘

草 白朮

各一分

右咬咀每服五錢水煎相次一服汗出止

一法

出濟生  
拔萃方

治陰症諸藥不效并湯水不下身冷脈絕

氣息不知人

丁香 草撥

乾薑

牡蠣

各等分  
燒粉

右用手心中以唾津調如泥以手掩其陰至煖汗出

為度

溫內玉抱肚

出衛生  
寶鑑方

治陰毒傷寒

川烏

細辛

良薑

天仙子

肉桂

牡蠣

胡椒

乾薑

各等  
分

右為細末醋糊調塗臍下以綿覆之

破棺丹

出華陀中  
藏經方

治厥陰面目俱青心下硬四肢冷脈



細而欲絕

硫黃

一兩酒  
煮三日

硃砂

一兩  
研

右為末酒糊九鷄頭大入室中勿令人知同病人掘  
一坑深一尺入粟稗火燒坑子極熟醋五升沃令  
氣出衣被鋪坑以酒化一丸服之後令病人坑上  
卧少時汗出愈

治傷寒陰症脫陽或因大吐大瀉之後四肢逆冷元氣  
不接不省人事或傷寒新瘥後與婦女交其症小腹

緊痛外腎搐縮面黑氣喘冷汗自出亦是脫陽症須

臍不治即不效

出衛生家寶方

葱白

炒令熟熨臍下次用

附子

白朮

半兩

乾薑

半兩

木香

一錢

右判碎用水兩碗煎至八分去滓放冷灌與服須臾

又進一服兩服滓再作一服如無前件藥只用單

方用桂皮二兩好酒二升煎至一升候溫分作二

服灌與如無桂皮只用連翹葱白三七莖細判就

砂盆中研細用酒五升煮至二升分作三服灌陽

氣即回先更用炒鹽熨臍下氣海之所勿令氣冷

為妙

治陰毒傷寒煩躁迷悶不治候人急者

出本草

右用大附子一箇可半兩者立劈作四片生薑一大塊刀劈作五片如中指長糯米一撮三味以水一升煎取六合去滓如人體溫頓服厚衣覆之或汗出或不出候心神定即別服水解散太白通關散之類不得與冷水如渴更將滓煎與服令人多用

有效故詳著之

陽毒

論

夫陽氣獨盛陰氣暴衰陰為陽所勝內外皆陽故為陽毒傷寒有初得病便成陽毒者有服湯藥經五六日以上不差變成陽毒者以病本屬陽或以火劫發其汗或因灸熅陽氣轉盛陰氣內消所致其候面赤發躁狂走妄言發斑如錦文咽喉痛疼涕唾膿血或下利黃赤其脈洪實滑促是也 歌括陽毒已深脈洪大內外結熱

舌卷焦黑鼻中如煙煤宜用水漬法傷寒一二日便成  
陽毒或服藥吐下後變成陽毒身重腰背痛煩悶不安  
狂言或走或見鬼或吐血下利赤黃其脈浮大而數面  
赤斑斑如錦文咽喉疼痛腫膿血五六日可治至六七  
日不可治陽毒升麻湯主之咽痛玄參升麻湯甚者或  
有踰垣上屋陽毒脈弦洪促數身熱無汗陽毒升麻湯葶  
蘆苦酒湯即醋大黃湯梔子仁湯黑奴丸太乙牛黃膏  
用竹葉湯調下或研生地龍大者三條入生薑汁薄荷

汁生蜜腦子各少許新汲水調灌下可選用之令陰氣復而大汗解矣陽毒大熱煩渴譫語赤斑衄血不止白虎湯一服效陽毒已深脈洪大內外結熱舌卷黑鼻中如煙煤用新汲水浸濕布數重搭於腦上續又換新水浸布漬冷熱勢纔減即止本事方灸結胸巴豆肉七粒黃連七寸搥細津唾調膏安於臍艾灸其上不拘壯數以腹中有聲為效灸畢即以湯蘸軟帛拭之恐或瘡爛此方與集驗神功散一同陰陽二毒但有微氣者皆可

灸臍間有聲即得汗解尚藥孫用和破結丹治陰陽伏  
逆變為結胃五六日大便結攻之不及達之不可以此  
主之用錦辰砂銀青礞石北亭脂肉豆冠木香官桂牽  
牛黑附炮巴豆不去油各半兩輕粉麝香半錢金五箔  
右件將法醋半升八味硃砂附子牽牛三味熬成膏次  
入餘藥打和得所丸如皂子大輕粉衣每服二九蜜湯  
調下陽症如陰冷四肢滑沈尿赤大便稀面紅煩躁身  
微熱陰症如陽沈更微陰極發燥熱極發厥物極則反

也重陽必陰重陰必陽寒暑之變也四肢冷小便赤大便閉或黃色黑眼開言動脈沈而滑謂之陽症似陰面赤煩躁身有微熱眼閉發熱脈沈而微謂之陰症似陽欲知的定當推原反本察色聽聲辨以六經參以外症徐徐焉據脈驗之數熱遲寒陰陽別矣陽之體輕陰之體重陰家脈重陽家脈輕陽盛旦靜陰盛夜寧陽虛暮亂陰虛夜爭陽症似陰白虎湯熱極生寒則四肢逆冷或用承氣湯陰症似陽四逆湯加蔥白主之陰盛則躁



下虛則面赤衰寒則身微熱也陽盛隔陽脈細沈矣身冷大煩躁嗜卧泥水之中欲飲水而不欲入口者是飲水者非可以服霹靂散少焰散丹砂丸亦效孫用和以半兩黑附子一枚燒存性候冷為末入真臘茶一大錢匕和為二服每服水一盞蜜半匙煎六分冷服躁止得睡汗出皆藥之驗也陰症太陽陽明少陽皆屬陽症也太陽者膀胱也發熱惡寒頭痛腰疼而脈浮也陽明者胃也不惡寒反惡熱濇濇汗出大便閉潮熱而脈長也

少陽者膽也口苦咽乾脅下滿發熱而嘔或往來寒熱而脈弦也麻黃湯大青龍湯桂枝湯治太陽經傷風寒也大柴胡湯調胃承氣湯小承氣湯大承氣湯治陽明傷寒也小柴胡湯治少陽傷寒也其他藥皆發汗吐下後症也若陽氣獨盛陰氣暴絕即為陽毒必發躁狂走妄言面赤咽痛身斑斑如錦文或下利赤黃脈洪實或滑促當以酸苦之藥令陰復而大汗解矣古人云酸苦湧泄為陰謂苦參大青葶藶苦酒之類能復其陰氣也

微用苦甚兼用酸苦折熱復陰若熱極折熱復陰若熱極發厥陽症似陰學者以脈別之

方

升麻散 治傷寒一日便成陽毒或服藥發汗吐下之後毒氣不解身背強煩悶狂言或走或見鬼神面赤斑斑狀如錦文咽喉痛及下膿血

川升麻 射干

各一兩

當歸

剉微炒

犀角屑

甘草

炙

赤剉各半兩

黃芩

黃連

去鬚

地骨皮

各三分

右搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓  
不計時候溫服

麥門冬散 治陽毒傷寒身體痛疼頭面如火心胸煩  
熱而渴小便赤黃不得睡卧宜服

麥門冬去心 葛根剉 柴胡去苗 赤芍藥 知母 馬

牙硝各一兩 子芩 玄參 甘草炙微赤剉 川升麻

犀角屑各半兩

右搗羅為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓

不計時候溫服

犀角散 治陽毒傷寒狂言亂走面赤斑斑咽喉乾痛  
心胸煩滿四肢拘急小便赤黃

犀角屑

甘草

炙微赤剉  
各半兩

射干

川大黃

剉碎  
微炒

黃

芩

各三分

柴胡

去苗

川升麻

川芒硝

麥門冬

去心  
焙各

一兩

右搗羅為散每服四錢以水一中盞入淡竹葉三七

片小麥五十粒煎至六分去滓不計時候溫服

石膏散 治陽毒傷寒熱壯頭痛肢體煩重口乾心躁

石膏

一兩

知母

柴胡

去苗

麻黃

去根

甘草

炙微

黃芩

赤剉

赤芍藥

防風

去蘆頭

赤茯苓

川升麻

甘菊花

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分葱白七寸豆豉一百粒煎六分去滓不拘時候溫服

大黃散

出活人書

治陽毒傷寒未解熱結在內恍惚如狂者

川大黃

一兩半

剉碎微炒

桂心

三分

川芒硝

二兩

甘草

炙微

木

通

大腹皮

剉各一兩

桃仁

二十枚

湯浸去皮

雙仁麤炒微黃

右搥羅為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓  
不計時候溫服以通為度

地骨皮散

出聖惠方

治陽毒傷寒頭昏身重咽喉唇乾腮赤

狂言欲走心胸脹滿嘔逆不下飲食面色斑斑如錦

文

柴胡

一兩去苗

地骨皮

木香

麻黃

去根節

甘草

炙微赤剉

川升麻

蘇蘇根

人參

去蘆頭

赤茯苓

木通

剉已

上各

半兩

右搗羅為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓  
不計時候溫服

柴胡散

一名梔子仁  
湯出活人書

治陽毒傷寒壯熱百節疼痛

柴胡

一兩半  
去苗

川升麻

黃芩

石膏

杏仁

湯浸  
去皮

尖雙仁麩炒微黃  
色已上各三兩

赤芍藥

大青

知母

梔子

仁

各一  
兩

甘草

右搗羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分豉  
一百粒煎至六分去滓不計時候



桂枝麻黃散

出聖惠方

治陽毒傷寒項背汗出急強惡風

桂枝 麻黃

去根節

甘草

炙微赤判

赤芍藥

葛根

杏

仁

湯浸去皮尖雙仁  
麴炒微黃各一兩

右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候熱服衣覆取汗如人行十里未有汗再服良久以葱白豉粥投之

白虎湯

出三因方

治陽毒傷寒服桂枝湯大汗出後大渴煩

躁不解脈洪大者

知母 甘草

炙微赤 剉 各一兩

麻黃

二兩 搥碎

粳米

一合

右細剉以水二大盞煮米熟為度去滓不計時候溫

三服

治陽毒傷寒四肢壯熱心膈煩躁嘔吐不止宜服此方

出聖

惠方

柴胡

去苗

黃芩

人參

甘草

炙微赤 剉 各一兩

麥門冬

去心

焙一兩

半夏

半兩湯浸七遍洗去滑

右搥羅為散每服四錢水一中盞入竹葉三七片生

薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

蘇蘇散

出聖惠方

治陽毒傷寒五六日已上俱胸中煩熱乾

嘔

蘇蘇

柴胡

去苗

知母

黃芩

甘草

炙微赤剉各一兩半

廬

根

二兩剉

右搗羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎

至六分去滓不計時候溫服

甘草散

出聖惠方

治陽毒傷寒脈洪大心中悸壯熱

甘草

炙微赤剉

桂心

茯神

人參

去蘆頭

阿膠

揔碎炒令黃燥

麥門冬

去心已上各一兩

生乾地黄

麻黃

去根節各二兩

右揔篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎

至六分去滓不計時候溫服

黃芩散

出聖惠方

治陽毒傷寒氣盛昏昏如醉熱躁煩渴口

苦舌乾

黃芩

川升麻

柴胡

去苗各一兩

石膏

二兩

赤芍藥

麥門冬

去心

甘草

炙微赤剉各半兩

右搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓

不計時候溫服

牛黃丸

出聖惠方

治陽毒傷寒心躁煩悶恍惚如狂結熱不

散

牛黃

細研

天竺黃

細研

防風

去蘆頭

真珠

細研已上

龍腦

甘草

炙微赤判各一兩

射香

一錢細研

犀角屑

羚羊角屑

硃砂

細研水飛過

黃芩

川升麻

各一兩

右搗羅為末入前研了藥更研令勻以煉蜜和搗三

二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以溫水嚙下十五丸

治陽毒傷寒煩熱大便不通

川大黃

一兩判  
碎微炒

川芒硝

半兩

右搗篩以水一大盞煎至七分去滓不計時候分溫二服如人行五七里再服當利下惡物

治陽毒傷寒毒氣在臟狂言妄語欲走起者宜服此方

龍膽

一兩去  
蘆頭

鐵粉

二兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以磨刀水調下

一錢

升麻湯

出活人書

治傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下之

後變成陽毒腰背痛煩悶不安面赤狂言或走見鬼  
或下利脈浮大數面赤斑文如錦咽喉痛出膿血五  
日可治七日不可治

升麻 犀角

鎔

射干

黃芩

去黑皮

人參

甘草

炙

各一

兩

右六味劉如麻豆大每服五錢以水一盞半煎至八分去滓溫服食頃再服溫覆出汗未汗再服甚者大承氣湯除厚朴加木通甘草大腹皮桃仁各一兩以利為效

瀉心湯

出聖濟總錄

治陽毒傷寒頭痛壯熱狂言妄語似見

鬼神

石膏

一兩

芍藥

葛根

剉

黃芩

去黑心

各半兩

大黃

黃連

去鬚各

三分



右搗篩每服五錢以水一盞半生薑一棗大拍碎煎

至八分去滓溫服日二不拘時

升麻湯

出聖濟總錄

治陽毒傷寒腰背疼痛煩悶面赤狂言

妄走或見鬼下利無常赤斑如錦文咽喉痛唾膿血

升麻

雄黃

醋煮研各半兩

當歸

切焙

桂

去粗皮各一兩

甘草

炙剉二分

鼈甲

醋炙去裙襴一兩

右麤搗篩每服五錢以水一盞半煎至八分去滓溫

服日二不拘時候

大青湯

出聖濟總錄

治陽毒傷寒煩躁不解或下利危困

大青

二兩

秦艽

去苗土一兩

犀角

鎔

山梔子仁

甘草

炙對

黃連

去鬚各半兩

右麤搗篩每服五錢以水一盞半豉一百粒薤白七

寸煎至八分去滓食前溫服

解陽湯

出聖濟總錄

治陽毒傷寒口舌乾燥

麻黃

去根節

人參

赤茯苓

去黑皮

桂

去粗皮各半兩

麥門冬

去心焙

葛根

剉各三分

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒

甘草

炙對各一兩

右麤搥篩每服五錢以水一盞半生薑一棗大拍碎

煎至八分去滓溫服不拘時

五解湯

出聖濟總錄

治陽毒傷寒發熱煩躁

山梔子仁

黃芩

去黑皮

甘草

炙判

大黃

劉醋炒各一分

朴硝

二錢

右麤搥篩每服五錢以水一盞半煎至八分去滓空

心溫服

犀角湯

出聖濟總錄

治陽毒傷寒初得身體大熱眼赤小便

黃心悶頭疼煩渴不止四肢酸痛心中悶絕言語錯亂睡中多驚

犀角

鎊一兩

人參

三分

赤茯苓

去黑皮

茵陳蒿

細辛

去苗

陳橘皮

湯浸去白炒

麻黃

去根節

甘草

炙判各半兩

右麤搗篩每服五錢以水一盞半生薑一棗大拍碎

煎至八分去滓溫服

葛根湯

出聖濟總錄

治陽毒傷寒頭痛壯熱未解身體疼痛

葛根

判

龍膽

大青

各三分

桂

去粗皮

萎蕤

芍藥

黃芩

去黑心

升麻

石膏

碎

麻黃

去根節

甘草

炙對各半兩

右麤搗篩每服五錢以水一盞半生薑一棗大拍碎

煎至八分去滓不拘時候溫服

葛根散

出聖濟總錄

治陽毒傷寒身熱如火頭疼燥渴咽喉

乾痛

葛根

對三分

山梔子仁

黃芩

去黑心

大黃

對醋炒

甘草

炙對各

朴硝

一兩

半兩

右搗篩羅為散每服二錢不拘時候溫服熟水調下

秦艽湯

出聖濟  
總錄

治陽毒傷寒心躁悶亂煩熱狂語口乾

不止

秦艽

去苗  
土

黃芩

去黑  
心

甘草

炙  
判

木通

枳殼

去穢  
起炒

玄

參

各半  
兩

芍藥

桔梗

炒

吳藍

山梔子仁

各半  
分

枳

杷葉

三分拭去  
毛姜汁炙

右麤搗羅篩每服五錢以水一盞半煎至八分去滓

溫服不拘時候

清涼散

出聖濟  
總錄

治陽毒傷寒口乾煩躁大渴發汗

葛根

判二兩

大黃

判炒

黃芩

去黑心

朴硝

麻黃

去根節

甘

草

炙對各一兩

桂

去粗皮三分

右搗羅為散每服二錢以新汲水調下

琥珀丸

出聖濟總錄

治陽毒傷寒六七日間服熱藥過度致

使陽氣內伏身體微熱眼目爪甲盡黃心下鞭痛語

澀舌乾昏燥

琥珀

研一分

黃連

去鬚

黃蘗

去粗皮

大黃

煨對各半兩

巴豆

去皮

心焙出油

取雷二錢

右搗羅四味為細末與巴豆霜拌勻煮薄麪糊為丸

如萊豆大每服一丸柳枝湯下不拘時

妙應湯

出聖濟總錄

治陽毒傷寒遍身壯熱大喘上氣躁悶

甘草

灸判

人參

赤茯苓

去黑皮各一兩

大黃

煨判

山梔子

去皮

麻黃

去根節各半兩

陳橘皮

去白炒

木香

各一分

右麤搗篩每服三錢以水一盞入蜜一匙生薑汁少

許煎至八分去滓冷服不拘時

鐵粉散

出聖濟總錄

治陽毒傷寒發狂走者



鐵粉

朴硝

各一兩

天竺黃

半兩

龍腦

一分

右四味研勻令細每服二錢以鷄清水調下不拘時

水漬法

出活人書

治陽毒盛內外結熱煩躁

右以新汲水漬疊布數重搭於腦上須臾蒸熟再浸再搭數換新水浸之此良法也

治陽毒傷寒壯熱頭痛心神煩躁利胸膈

出肘後方

右用生爪菜搗取自然汁飲之葉生搗貼腫毒

升麻湯 治傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下之後

變成陽毒身重腰背疼痛煩悶不安狂言或走或見  
鬼神或吐血下利其脈浮大數面赤斑斑如錦文咽  
喉痛唾膿血五日可療至七日不可療也宜服升麻  
湯肘後陽毒升麻湯治症同無梔子鼈甲

升麻

二分

當歸

二分

蜀椒

出汗一分

雄黃

研

梔子

桂心

各一分

甘草

三分炙

鼈甲

大如手一片炙

右件藥切以水五升煮取二升半分三服如人行五  
里久再服溫覆手足毒出則汗汗出則解不解重

作服亦取得吐佳陰毒去雄黃忌海藻菰菜生葱  
葦菜張仲景方無梔子桂心陰毒去雄黃蜀椒

治陽毒傷寒昏憤不知藥食隔斷者

出經驗良方

右將早晚白米用新汲水爛研作漿頻頻灌之能解

諸毒續穀氣

陽毒梔子湯

一名梔子仁湯  
出濟生拔萃方

治陽毒傷寒壯熱百節疼

痛

升麻 梔子仁 黃芩 芍藥 石膏 知母

甘草 杏仁 柴胡

各等分

右為麤末每服五錢生薑五片豉百粒水煎服一方

有大青

治陽毒傷寒面赤頭痛身上熱如火心神躁眼赤睛逆  
露頭目昏眩項背強直坐卧不安大便閉熱脈氣洪

大

麻黃

去根

杏仁

去尖

山梔

黃芩

柴胡

前胡

各去毛

大黃 白朮 桔梗 通草 羌活 秦艽 乾

葛 牡丹皮 荊芥穗 各一分 牽牛 半夏 四錢 黃連

細辛 各三錢

右搗羅為末每服五錢以水一碗生薑三片葱三枝  
同煎一兩沸食後熟服

浴腸湯 治陽厥發狂將成疸

大黃 四兩濕紙裹 大青 一兩 梔子 一兩 甘草 一兩炙

右水五升煎至二升內外須五合再發去一升分四  
服量虛實與之

治陽毒人胃下血頻疼痛不可忍

右用鬱金五箇大者牛黃一皂莢子別研細二味同  
為散每服用醋漿水一盞同煎三沸溫服

普濟方卷一百三十五